

Toevoeging klasse IL17-remmers en small-molecule inhibitor apremilast – patiënten met plaque psoriasis

De domeingroep inflammatoire dermatosen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is van mening dat de klasse IL17-remmers (secukinumab en ixekizumab) en de small-molecule inhibitor apremilast moeten worden toegevoegd aan het behandelarsenaal voor patiënten met plaque psoriasis.

Gezien de recente registraties en goedkeuring voor vergoeding van de NZA ontbreken secukinumab, ixekizumab en apremilast nog in de huidige richtlijn, maar zullen hieraan worden toegevoegd. Deze middelen zijn een belangrijke aanvulling van het huidige behandelarsenaal, geschikt voor volwassen patiënten met matig ernstige tot ernstige plaque psoriasis, die in aanmerking komen voor systemische behandeling (secukinumab, ixekizumab) danwel voor de behandeling van matige tot ernstige chronische plaque-psoriasis bij volwassen patiënten die geen respons hebben vertoond op of die een contra-indicatie hebben voor, of die intolerant zijn voor een andere systemische behandeling, zoals cyclosporine, methotrexaat of PUVA (psoraleen en ultraviolet-A-licht) (apremilast).