

## DERMATOLOGIE IN BEELD

# Neonatale zuigblaren

T. van Meurs, A.C.A Devillers

*Dermatoloog, afdeling Dermatologie,  
Maasstadziekenhuis, Rotterdam*

*Correspondentieadres:  
Tim van Meurs  
E-mail: tvmeurs@hotmail.com*

Wij zagen een atermepasgeboren jongen met lineaire blaren op beide onderarmen en handruggen (figuur 1). De plaats en rangschikking passen goed bij de diagnose zuigblaren. Zuigblaren ontstaan door een sterke intra-uteriene zuigreflex en zijn meestal gelokaliseerd op de distale bovenste extremiteiten. Na enkele dagen was er sprake van spontane genezing (figuur 2).

De differentiële diagnose van bulleuze aandoeningen in de neonatale periode omvat naast infectieuze aandoeningen als herpes simplex en impetigo bullosa ook epidermolysis bullosa, neonatale lupus erythematosus, bulleuze mastocytose en incontinentia pigmentia.

Bekendheid met de diagnose zuigblaren kan helpen om ouders in een vroeg stadium gerust te stellen. Zuigblaren herstellen spontaan binnen enkele dagen.

Omdat herpesinfecties in de neonatale periode potentieel levensbedreigend zijn, werd dit zekerheidshalve via PCR van blaasjesvocht uitgesloten.

