



Standpunt geregistreeerde en niet-geregistreeerde fumaraten

Domeingroep Inflammatoire dermatosen

Advies voor keuze voor behandeling bij patiënten met psoriasis: de werkgroep is van mening dat bij patiënten die behandeld gaan worden met een fumarat, gestart dient te worden met het geregistreeerde preparaat Skilarence®. Indien er ontolereerbare bijwerkingen optreden, kan worden overgegaan op een ander, niet-geregistreeerd preparaat, waaronder dimethylfumarat MSR MVA (met vertraagde afgifte). Bij patiënten die reeds met een niet-geregistreeerd fumarat behandeld werden op het moment van registratie van Skilarence®, verdient het de voorkeur om deze patiënten over te zetten naar Skilarence®. Voor patiënten die reeds naar tevredenheid behandeld werden met een niet-geregistreeerd fumarat op het moment van registratie van Skilarence® en dit willen blijven gebruiken, moeten de niet-geregistreeerde fumaraten beschikbaar en vergoed blijven. Op dit moment is dimethylfumarat MSR MVA (Psorinovo®) het enige beschikbare niet-geregistreeerde fumarat in Nederland. Er is geen vergelijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van Psorinovo® of andere dimethylfumarat MVA-preparaten in relatie tot andere fumaraten zonder vertraagde afgifte.

Er zijn slechts anekdotische data over dimethylfumarat MVA gepubliceerd. [1-3] Het idee achter dimethylfumarat MVA is dat dit minder gastro-intestinale bijwerkingen zou hebben. Hier is echter nooit vergelijkend onderzoek naar gedaan. Tegenwoordig wordt veel belang gehecht aan *shared decision-making*. Dat betekent dat er verschillende behandelopties zijn en dat arts en patiënt gezamenlijk kiezen voor de best passende behandeling. Daarom is het belangrijk dat alle effectieve behandelingen beschikbaar blijven en dat meer bewijs wordt gegenereerd over de effectiviteit en veiligheid van niet-geregistreeerde fumaraten.

WAT MOET MEN DOEN BIJ HET VOORSCHRIJVEN VAN PSORINOVO®

De behandelend dermatoloog moet expliciet op het recept vermelden dat

- het om dimethylfumarat tablet MSR MVA 120 mg (Psorinovo®) gaat;
- hij/zij bekend is met Skilarence® als eerste keus, maar bewust daarvan afwijkt in overleg met de patiënt omdat hiervoor goede gronden zijn. Een goede reden is bijvoorbeeld een jarenlang gebruik van Psorinovo®, met goed effect, zonder bijwerkingen.

Daarna het recept opsturen naar GMP-Apotheek Mierlo-Hout (Steenovenweg 15, 5708 HN Helmond).

LITERATUUR

1. Van Geel MJ, van de Kerkhof PCM, Oostveen AM, de Jong EMGJ, Seyger MMB. Fumaric acid esters in recalcitrant pediatric psoriasis: A prospective, daily clinical practice case series. *J Dermatolog Treat* 2016;27(3):214-20.
2. Balak DMW, Oostveen AM, Bousema MT, et al. Effectiveness and safety of fumaric acid esters in children with psoriasis: a retrospective analysis of 14 patients from the Netherlands. *Br J Dermatol* 2013;168(6):1343-7.
3. Lijnen R, Otters E, Balak D, Thio B. Long-term safety and effectiveness of high-dose dimethylfumarate in the treatment of moderate to severe psoriasis: a prospective single-blinded follow-up study. *J Dermatolog Treat* 2016;27(1):31-6.

CORRESPONDENTIEADRES

Domeingroep Inflammatoire dermatosen

E-mail: secretariaat@nvdv.nl